

INFORMACION PARA PADRES SOBRE VACUNAS NO FINANCIADAS, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRIA

1. VACUNA FRENTE AL NEUMOCOCO

El neumococo es una bacteria que puede causar infecciones graves como meningitis, sepsis y neumonías, particularmente en niños pequeños (menores de 5 años y especialmente menores de 2 años). También produce infecciones más leves como otitis y sinusitis.

Existen dos vacunas contra el neumococo en el mercado: **PREVENAR 13** (incluye 13 serotipos) y **SYNFLORIX** (incluye 10 serotipos).

Se administran 4 dosis, a los 2, 4 y 6 meses de edad y una dosis de recuerdo en el segundo año de vida (12-15 meses). El número de dosis recomendadas varía según la edad de comienzo de la vacunación, pero hay que tener en cuenta que si la vacunación se inicia más tarde, la protección inducida por la vacuna empezará más tarde.

2. VACUNA FRENTE AL ROTAVIRUS

El rotavirus es un virus que con frecuencia es el responsable de las gastroenteritis agudas en los niños pequeños. El cuadro clínico es habitualmente benigno con vómitos, diarrea y a veces fiebre, pero puede ser más grave en los lactantes pequeños, que en ocasiones precisan ingreso hospitalario. Existen dos vacunas contra el rotavirus: **ROTATEQ** (incluye 5 serotipos) y **ROTARIX** (incluye 1 serotipo), aunque sólo RotaTeq está actualmente disponible en el mercado.

Se administran 3 dosis, a los 2, 4 y 6 meses de edad por vía oral (bebida). La primera dosis puede ser administrada a partir de las 6 semanas de vida, pero la última siempre antes de las 32 semanas

3. VACUNA FRENTE AL VIRUS DE LA VARICELA

La varicela es una infección producida por el virus varicela-zóster que afecta principalmente a los niños, pero también a adultos que no pasaron la varicela en su infancia. Aunque suele ser una enfermedad benigna, en ocasiones puede presentar complicaciones graves como sobreinfecciones bacterianas (cutáneas o generalizadas), neumonías o complicaciones neurológicas (meningoencefalitis). Existe una vacuna disponible en el mercado para uso extrahospitalario: **VARIVAX**.

Se administran 2 dosis, la primera a los 12-15 meses y la segunda a partir de los 2 años. Un niño que no ha pasado la varicela puede ser vacunado a cualquier edad pero siempre con 2 dosis, separadas por un intervalo de al menos un mes.

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares incluye la vacuna de la varicela en su calendario vacunal a los 11 años de edad, para aquellos niños que no hayan pasado la enfermedad y no hayan sido vacunados

ALGUNAS DE LAS MEJORES WEBS SOBRE VACUNAS

- Web del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (www.vacunasaep.org)
- Web de la Asociación Española de Vacunología (www.vacunas.org)
- Web del National Immunization Program del CDC (www.cdc.gov/vaccines)
- Web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (www.who.int/immunization)